

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Gripex[®]
V-caps

(Paracetamolum + Coffeinum
+ Phenylephrini hydrochloridum)
(300 mg + 25 mg + 5 mg), kapsułki twarde

Skład:

1 kapsułka twarda zawiera:

substancje czynne: paracetamol 300,0 mg, kofeina 25,0 mg, chlorowodorek fenylefryny 5,0 mg; *substancje pomocnicze:* skrobia, kroscarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza żółty tlenek (E 172), błękit patentowy (E 131), żółcień chinolinowa (E 104).

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław,
ul. Ziębicka 40

Dostępne opakowania:

6 kapsulek w blistrze, 8 kapsulek w blistrze, 10 kapsulek w blistrze, 12 kapsulek w blistrze, 20 kapsulek (2 blistry po 10 kapsulek), 24 kapsułki (2 blistry po 12 kapsulek). Blistry pakowane są w tekturowe pudełko z ulotką.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Gripex V-caps i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Gripex V-caps
3. Jak stosować Gripex V-caps
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Gripex V-caps
6. Inne informacje

1. Co to jest Gripex V-caps i w jakim celu się go stosuje

Gripex V-caps to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciw-

bólowym. Łagodzi objawy występujące podczas przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, katar, kichanie, uczucie ogólnego rozbicia.

2. Zanim zastosuje się Gripex V-caps

Nie należy przyjmować leku Gripex V-caps w przypadku:

- wcześniej stwierdzonej nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne, którykolwiek składnik leku lub aminy sympatykomimetyczne;
- niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca;
- wysokiego ciśnienia tętniczego;
- wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej;
- ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej;
- jaskry z wąskim kątem przesączania;
- nadczynności tarczycy.

Nie należy także stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania, w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, w czasie leczenia zydowoduną oraz w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując Gripex V-caps

Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone, stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób: z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, rozrostem gruczołu krokowego, zespołem Raynaud'a, cukrzycą, chorobą wieńcową, przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki z grupy antagonistów receptorów β - adrenergicznych. W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm
Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Leku nie należy stosować równocześnie

z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kofeinę lub sympatykomimetyki, a także z: inhibitorami MAO (leki stosowane w niedociśnieniu tętniczym oraz w depresji), doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna), sympatykomimetykami (leki stosowane, np. w astmie) i hormonami tarczycy, z guanetydyną, mekamlaminą, metyldopą, rezerpiną (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia), indometacyną (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny), antagonistami receptorów β - adrenergicznych (stosowanymi w niewydolności krążenia, nadciśnieniu tętniczym lub w chorobie niedokrwiennej serca). Podawanie w skojarzeniu z ryfampicyną (lek przeciwbakteryjny stosowany, m.in. w gruźlicy), lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (działają nasennie i przeciwdrgawkowo) lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby powoduje zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby. Przed zastosowaniem metoklopramidu (lek przeciwwymiotny i usprawniający czynność przewodu pokarmowego), cholinolityków (leki stosowane w chorobach oskrzeli, w skurczach mięśni gładkich przewodu pokarmowego, do rozszerzenia żrenic), doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny (lek przeciwzrądowy), chinologów (leki przeciwbakteryjne), metoksalenu (lek przeciwłuszczycowy), meksyletyny (stosowane w zaburzeniach rytmu serca), werapamilu (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca i w nadciśnieniu), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Gripex V-caps

Lek należy stosować doustnie. *Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:* 2 kapsułki co 4-6 godz. (maksymalnie 12 kapsulek na dobę). Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki

Lek służy do doraźnego łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych. *Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.*

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana

Mogą wystąpić: nasilone nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpięciem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. Mogą również wystąpić objawy takie jak: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, błądzość powłok, zaburzenia oddychania, bezsenność. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina należy sprokować wymioty i skontaktować się z lekarzem.



4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gripex V-caps może powodować działania niepożądane. Należą do nich:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, pokrzywka, obrzęk naczyńioruchowy (obrzęk skóry i tkanki podskórnej twarzy, czasem także ust, jamy ustnej i języka oraz krtani);
zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, nadkwaśność treści żołądkowej;
zaburzenia układu krążenia: tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zaburzenia rytmu serca, błądność powłok;
zaburzenia układu oddechowego, kłatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zaburzenia oddychania;
zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, niewydolność nerek;
zaburzenia układu nerwowego: lęk, niepokój, drżenia mięśniowe, niemożność skupienia uwagi, bezsenność, ból głowy;
zaburzenia psychiczne: lęk, nerwowość, drażliwość;
zaburzenia krwi i układu chłonnego: agranulocytoza (brak rodzaju białych krwinek, zwanych granulocytami objętnochłonnymi co powoduje znaczne zmniejszenie odporności i rozwój zakażeń, najczęściej owrzodzeń w jamie ustnej i migdałkach), niedokrwistość (brak wystarczającej liczby czerwonych krwinek i za małe stężenie ich barwnika czyli

hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek zwanych limfocytami, co powoduje zmniejszenie odporności na zakażenia).


W przypadku doraźnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Gripex V-caps

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i opakowaniu bezpośrednim (miesiąc/rok). Zastosowane oznakowanie dla blistra: EXP - termin ważności, LOT - numer serii.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do :
 USP ZDROWIE Sp. z o.o.,
ul.Poleczki 35,
02-822 Warszawa
tel.: +48 (22) 543 60 00.

Data opracowania ulotki: marzec 2011